


Regimul hidrologic al lunii august 2026

Fluviul Nistru

Sectorul s. Naslavcea-or. Camenca

Scurgerea apei a înregistrat valori cuprinse între 30 și 40% din valorile medii lunare multianuale. Pe parcursul primei decade a lunii august, debitul mediu zilnic deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk (Ucraina) a constituit 85,0 m³/s, începând cu decada a doua și până la 27 august debitul a fost redus până la 75,0 m³/s, iar începând cu 28 august, acesta a fost redus din nou, până la 60,0 m³/s.

Ca urmare, pe parcursul întregii luni s-au înregistrat variații ale nivelului apei, cuprinse între 0,15 și 0,40 m.




Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Hrusca

Sectorul or. Dubăsari - s. Răscăieți


Pe parcursul lunii, scurgerea apei a constituit 30% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul lunii analizate, ca urmare a variației debitelor deversate din lacul de acumulare Dubăsari, cuprinse între 60,0 și 100 m³/s, pe acest sector s-au înregistrat oscilații ale nivelului apei de aproximativ 0,20 și 0,40 m.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Tighina/Bender

Pe parcursul lunii august, nivelul apei în lacul de acumulare Dubăsari a oscilat cu circa 0,20 m.



Dinamica nivelului apei în lacul de acumulare Dubăsari

Râul Prut

Sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca


Scurgerea apei pe acest sector a constituit 20% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade a lunii, pe sectorul analizat a avut loc scăderea nivelului apei cu circa 0,10 m.

La sfârșitul primei decade a lunii, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în cursul superior al râului Prut (Ucraina), pe sectorul analizat s-au produs două creșteri succesive ale nivelului apei, cu amplitudini cuprinse între 0,10 și 0,30 m, separate de o scădere temporară.


Începând cu decada a doua a lunii, în regimul hidrologic al acestui sector s-a observat o scădere a nivelului apei cu 0,20 și 0,30 m.

La începutul decadei a treia a lunii, un nou episod de precipitații în cursul superior al râului Prut a determinat o nouă creștere a nivelului apei, cu amplitudini cuprinse între 0,10 și 0,15 m. Ulterior, până la sfârșitul lunii, nivelul apei a înregistrat o tendință continuă de scădere.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Șirăuți

Pe parcursul lunii august, nivelul apei în lacul de acumulare Costești-Stânca a scăzut cu 1,60 m, deoarece debitul deversat a fost mai mare decât aportul de apă în lac.




Dinamica nivelului apei în lacul de acumulare Costești-Stânca

Sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei a constituit valori cuprinse între 25 și 35% din valorile medii lunare multianuale.

Începând cu prima decadă și până la mijlocul decadei a treia a lunii august, din cauza oscilației deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stânca cu valori cuprinse între 38,0 și 43,0 m³/s, pe sectorul analizat a avut loc variația nivelului apei cu 0,10 și 0,30 m.

Începând cu mijlocul decadei a treia, din cauza micșorării deversării apei din lac, de la 42,0 la 27,0 m³/s, pe sectorul or. Costești-or. Cantemir s-a înregistrat o scădere a nivelului apei cu 0,10 și 0,40 m.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Ungheeni

Râurile mici

Scurgerea apei în râurile mici a constituit:

- **sub 10%** din valorile medii lunare multianuale: r. Draghiște PH Trinca, r. Cubolta PH Cubolta, r. Ciulucul Mic PH Telenești, r. Botna PH Căușeni;
- **15-20%** din valorile medii lunare multianuale: r. Vilia PH Bălăsinești, r. Ichel PH Goian;
- **30-50%** din valorile medii lunare multianuale: r. Răut PH Jeloboc, r. Căinar PH Sevirova, r. Lunga PH Ceadâr-Lunga.

Pe parcursul lunii august, regimul hidrologic al râurilor mici din țară a fost variabil, ca urmare a caracterului predominant local al precipitațiilor. Pe majoritatea râurilor mici s-au înregistrat oscilații ușoare ale nivelului apei, în timp ce schimbări mai semnificative au fost observate doar pe unele râuri și sectoare.

Astfel, pe râul Răut, la postul hidrometric Bălți, la mijlocul decadei a treia a lunii, nivelul apei a crescut cu circa 0,20 m. Începând cu mijlocul decadei a treia, pe râul Căinar, la postul hidrometric Sevirova, s-a înregistrat o creștere a nivelului apei cu aproximativ 0,17 m.

Totodată, pe parcursul lunii august, pe râul Răut, la postul hidrometric Jeloboc, nivelul apei a scăzut treptat cu circa 0,10 m.

**Șef al Centrului
de prognoze și avertizări**

Tatiana DASCAL