

Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu
Centrul de prognoze și avertizări


Regimul hidrologic al lunii septembrie 2026

Fluviul Nistru

Sectorul s. Naslavcea-or. Dubăsari

Scurgerea apei a constituit aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale. Începând cu prima decadă și până la mijlocul decadei a treia a lunii, ca urmare a menținerii debitului mediu zilnic deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk (Ucraina) la 60,0 m³/s, pe sectorul analizat s-au înregistrat variații ale nivelului apei cuprinse între 0,10 și 0,20 m.


Începând cu mijlocul decadei a treia a lunii, în urma reducerii debitului mediu zilnic deversat din lacul de acumulare de la 60,0 la 30,0 m³/s, pe sectorul analizat s-a înregistrat o scădere a nivelului apei cu 0,10-0,80 m.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Hrusca

Regimul hidrologic în lacul de acumulare Dubăsari


Pe parcursul lunii septembrie, nivelul apei în lacul de acumulare Dubăsari a variat între aproximativ 28,09 și 28,38 m. În prima decadă a lunii, nivelul a avut o evoluție oscilantă, cu o tendință generală de scădere. Începând cu decada a doua, s-a conturat o tendință de creștere, întreruptă de unele oscilații de scurtă durată. Creșterea a continuat și în ultima decadă, iar spre sfârșitul lunii nivelul apei a ajuns la aproximativ 28,37–28,38 m.



Dinamica nivelului apei în lacul de acumulare Dubăsari

Sectorul în aval de lacul de acumulare Dubăsari

Scurgerea apei s-a menținut în limitele a 30-35% din valorile medii lunare multianuale. Regimul hidrologic pe acest sector a fost condiționat de deversările din lacul de acumulare Dubăsari, care au variat între 50,0 și 80,0 m³/s, determinând oscilații ale nivelului apei cuprinse între 0,10 și 0,30 m, cu perioade scurte de stabilizare.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Tighina/Bender


Râul Prut

Sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei pe acest sector a constituit 20-30% din valorile medii lunare multianuale.

Începând cu prima decadă și până la mijlocul decadei a doua a lunii, pe sectorul analizat s-a înregistrat o scădere ușoară a nivelului apei, de aproximativ 0,10 m.


Începând cu mijlocul decadei a doua a lunii, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în cursul superior al râului Prut, pe teritoriul Ucrainei, pe sectorul analizat s-a observat o creștere treptată a nivelului apei cu 0,10-0,20 m.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Șirăuți

Regimul hidrologic în lacul de acumulare Costești-Stânca

Pe parcursul lunii septembrie, nivelul apei în lacul de acumulare Costești-Stânca a scăzut cu 1,34 m, deoarece debitul deversat a fost mai mare decât aportul de apă în lac.




Dinamica nivelului apei în lacul de acumulare Costești-Stânca

Sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei a constituit valori cuprinse între 20 și 40% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul lunii septembrie, ca urmare a variației debitelor deversate din lacul de acumulare Costești-Stânca, cu valori cuprinse între 23,0 și 28,0 m³/s, pe sectoarele analizate s-au înregistrat următoarele variații ale nivelului apei:

- 0,20 m – pe sectorul or. Costești-s. Braniște;
- până la 0,10 m – pe sectorul s. Braniște-or. Cantemir;
- 0,10-0,20 m – pe sectorul or. Cantemir-s. Brînza.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Ungheni

Râurile mici

Scurgerea apei în râurile mici a constituit:

- **sub 10%** din valorile medii lunare multianuale: r. Draghiște PH Trinca, r. Cubolta PH Cubolta, r. Ciulucul Mic PH Telenești, r. Botna PH Căușeni;
- **15-20%** din valorile medii lunare multianuale: r. Vilia PH Bălăsinești, r. Ichel PH Goian;
- **30-50%** din valorile medii lunare multianuale: r. Răut PH Jeloboc, r. Căinar PH Sevirova, r. Lunga PH Ceadâr-Lunga.

Deși în luna septembrie scurgerea apei în râurile mici s-a menținut la valori reduse, în unele râuri s-au înregistrat creșteri temporare ale nivelului apei, datorită unor episoade de ploi cu

caracter local. Astfel, la mijlocul decadei a doua, nivelul apei a crescut cu circa 0,15 m pe râul Cogâlnic, la postul hidrometric Basarabeasca, și cu 0,25 m pe râul Lunga, la postul hidrometric Ceadâr-Lunga.

La începutul decadei a treia, în urma unui alt episod de ploi, pe râul Racovăț, la postul hidrometric Brînzei, nivelul apei a crescut cu aproximativ 0,10 m.

**Șef al Centrului
de prognoze și avertizări**

Digitally signed by Dascal Tatiana
Date: 2026.10.13 16:02:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Tatiana DASCAL