

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT



CENTRUL DE PROGNOZE ȘI AVERTIZĂRI

Regimul hidrologic al lunii ianuarie 2026

Fluviul Nistru

Sectorul s. Naslavcea-or. Camenca

Scurgerea apei în luna ianuarie a constituit aproximativ **50-60%** din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul lunii ianuarie, datorită menținerii deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsk de $100 \text{ m}^3/\text{s}$, pe sectorul s. Naslavcea-s. Unguri în regimul hidrologic nu s-au observat schimbări semnificative.

Începând cu decada a doua a lunii, din cauza formațiunilor de gheață, pe sectorul s. Unguri-or. Camenca a avut loc variația nivelului apei cu valori cuprinse între 0.50-1.40 m.

Sectorul or. Dubăsari-s. Răscăieți

Scurgerea apei a constituit aproximativ **50-60%** din valorile medii lunare multianuale.

Începând cu prima decadă și până la mijlocul decadei a treia, ca urmare a oscilației debitului mediu zilnic deversat din lacul de acumulare Dubăsari, de la $100 \text{ m}^3/\text{s}$ până la circa $125 \text{ m}^3/\text{s}$, s-au înregistrat variații ale nivelului apei cuprinse între 0.25-0.65 m.

Începând cu mijlocul decadei a treia, din cauza oscilației debitului mediu zilnic deversat din lac de la $50.0 \text{ m}^3/\text{s}$ la aproximativ $170 \text{ m}^3/\text{s}$, pe sectorul or. Dubăsari-or. Grigoriopol a avut loc variația nivelului între 0.90-1.40 m, iar pe sectorul or. Grigoriopol-s. Răscăieți – între 0.20-0.40 m.

Râul Prut

Sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei pentru luna ianuarie, pe sectorul dat, a constituit aproximativ **50%** din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul lunii ianuarie, din cauza formațiunilor de gheață, pe acest sector a avut loc variația nivelului apei cuprinse între 0.20-0.70 m.

Sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei, pe acest sector, a constituit aproximativ **40-60%** din valorile medii lunare multianuale.

Pe durata lunii ianuarie, din cauza menținerii deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stânca, de aproximativ $33.0 \text{ m}^3/\text{s}$, pe sectorul or. Costești-s. Braniște regimul hidrologic s-a menținut relativ stabil, iar pe sectorul s. Braniște-s. Brânza s-au observat variații ale nivelului apei cu valori cuprinse între 0.30-0.60 m, cauzate de formațiunile de gheață.

Râurile mici

Scurgerea apei în râurile mici a constituit:

- **10-30%** din valorile medii lunare (râurile: Draghiște, Răut, Cubolta, Căinar, Ciulucul Mic, Ichel, Botna);
- **80%** din valorile medii lunare multianuale. (râurile: Vilia, Ciorna).

Pe parcursul lunii ianuarie, din cauza formațiunilor de gheață, în regimul hidrologic al râurilor mici s-au observat variații ale nivelului apei cu valori cuprinse între 0.10-0.30 cm.

Starea gheții pe râurile și lacurile din țară

Pe parcursul primei decade a lunii, din cauza regimului termic scăzut, pe unele sectoare ale râurilor Prut și Nistru, precum și pe râurile mici, s-au menținut formațiunile de gheață.

Începând cu decada a doua și până la sfârșitul lunii, pe râurile și lacurile din țară s-a menținut prezența formațiunilor de gheață. Grosimea stratului de gheață a variat între 3 și 27 cm.

**Șef al Centrului
de prognoze și avertizări**

Tatiana DASCAL