


Regimul hidrologic al lunii iunie 2026

Fluviul Nistru

Sectorul s. Naslavcea-or. Camenca

Scurgerea apei a înregistrat valori cuprinse între 30% și 40% din valorile medii lunare multianuale. Cu toate acestea, volumul mediu zilnic deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk (Ucraina) s-a menținut constant la aproximativ 100 m³/s.

În contextul acestui flux regulat, pe parcursul întregii luni s-au înregistrat doar fluctuații firești ale nivelului apei, cuprinse între 0,20 și 0,40 m.




Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Soroca

Sectorul or. Dubăsari - s. Răscăieți

Pe parcursul lunii, scurgerea apei a constituit 30-35% din valorile medii lunare multianuale.

Regimul hidrologic a fost determinat de volumul evacuat din lacul de acumulare Dubăsari, debitele zilnice încadrându-se între 100 și 130 m³/s. În aceste condiții, variațiile nivelului apei în aval au fost reduse, încadrându-se între 0,30 și 0,50 m



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Tighina/Bender

Râul Prut


Sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei pe acest sector a constituit aproximativ 30-40% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade a lunii, ca urmare a precipitațiilor căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina), în regimul hidrologic s-au produs două creșteri succesive ale nivelului apei, cu amplitudini cuprinse între 0,20 și 0,60 m, acestea fiind separate de o scădere temporară.


Decada a doua a lunii a debutat cu un nou episod de precipitații înregistrat în cursul superior a generat variații ale nivelului apei cuprinse între 0,10 și 0,30 m, după care, până la sfârșitul lunii, nivelul apei a înregistrat o tendință continuă de scădere.

Pe întreaga perioadă, scurgerea apei nu a depășit limitele albiei minore.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Șirăuți

În aceeași perioadă, nivelul apei în lacul de acumulare Costești-Stânca a urmat inițial tendința de scădere înregistrată în luna mai. Odată cu creșterea aportului din amonte, nivelul lacului a început să crească, atingând valorile maxime în decada a doua a lunii. Începând cu decada a treia, pe fondul unui debit deversat mai mare decât aportul de apă, nivelul apei a reintrat într-o tendință continuă de scădere.



Dinamica nivelului apei în lacul de acumulare Costești-Stânca


Sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei a constituit aproximativ 30-40% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade a lunii, ca urmare a ploilor înregistrate atât pe afluenții de dreapta ai râului Prut din România, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, pe sectorul s. Braniște - s. Brânza s-a înregistrat o ușoară creștere a nivelului apei, manifestată spre sfârșitul decadei.

Începând cu decada a doua a lunii, nivelul apei a înregistrat o scădere treptată, care s-a menținut până la sfârșitul lunii, iar majorarea debitului deversat din lacul de acumulare Costești - Stânca spre sfârșitul lunii nu a determinat modificări semnificative ale nivelului.

Pe întreaga perioadă, scurgerea apei nu a depășit limitele albiei minore.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Braniște

Râurile mici

Scurgerea apei în râurile mici a constituit:

- **sub 20%** din valorile medii lunare multianuale: r. Cubolta PH Cubolta și r. Botna PH Căușeni;
- **30-50%** din valorile medii lunare multianuale: r. Căinari PH Sevrova și r. Ciulucul Mic PH Telenești;
- **50-80%** din valorile medii lunare multianuale: r. Vilia PH Bălăsinești, r. Draghiște PH Trinca, r. Răut PH Jeloboc, r. Camenca PH Camenca și r. Lunga PH Ceadâr-Lunga;
- **peste 90%** din valorile medii lunare multianuale: r. Beloci, PH Beloci, r. Ichel PH Goian.

În prima și în a doua decadă ale lunii, pe fondul precipitațiilor puternice și foarte puternice înregistrate pe teritoriul țării, în majoritatea râurilor mici s-au produs creșteri ale nivelului apei. În funcție de distribuția precipitațiilor și de timpul de propagare a scurgerii, undele de creștere s-au manifestat în perioade diferite: la sfârșitul primei decade sau la începutul celei de-a doua.

În majoritatea râurilor mici, creșterile nivelului apei au fost cuprinse între 0,10 și 0,40 m. Pe unele cursuri de apă, însă, s-au înregistrat valori mai semnificative, și anume: pe râul Ichel PH Goian, cu 1,10 m, pe râul Căinari PH Sevrova, cu 0,95 m, pe râul Răut PH Jeloboc, cu 0,93 m, pe râul Bâc PH Merenii Noi, cu 0,90 m, iar pe râul Botna PH Căușeni, cu 0,70 m.

În decada a treia a lunii, nivelul apei în majoritatea râurilor mici a înregistrat o tendință generală de scădere, fără producerea unor noi creșteri semnificative.

În contextul condițiilor hidrometeorologice menționate, au fost emise trei avertizări hidrologice: una de Cod galben în prima decadă și două în decada a doua: Cod galben și Cod portocaliu, privind riscul de viituri rapide și scurgeri importante pe versanți.

Deși s-au produs inundații locale cauzate strict de acumulările de apă pluvială și de scurgerile pe versanți, la posturile hidrometrice monitorizate, nivelurile apei s-au menținut în limitele albiilor minore.

**Șef al Centrului
de prognoze și avertizări**

Tatiana DASCAL