


Caracterizarea condițiilor meteorologice și agrometeorologice din vara anului 2026

Vara anului 2026 în Republica Moldova a fost neomogenă sub aspect termic. Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu $+20,4..+23,1^{\circ}\text{C}$, fiind cu $1,0-1,9^{\circ}\text{C}$ mai ridicată față de normă, ce se atestă în ultimii 20 de ani în medie o dată în 2 ani.



Temperatura maximă a aerului pe parcursul verii a urcat până la $+39^{\circ}\text{C}$ (iunie, SM Ceadăr-Lunga), ce se atestă în ultimii 20 de ani în medie o dată în 3 ani. Temperatura minimă a aerului a scăzut până la $+7^{\circ}\text{C}$ (iunie, SM Briceni).

Vreme caniculară pe teritoriul țării s-a semnalat în decada a treia a lunii iunie. Temperatura medie decadică a aerului a constituit $+23,6..+26,0^{\circ}\text{C}$, fiind cu $3,8-5,3^{\circ}\text{C}$ mai ridicată față de normă, ce în ultimii 20 de ani în luna iunie se atestă în medie o dată la 5 ani (fig. 1).

Vreme foarte caldă s-a semnalat de asemenea și în prima decadă a lunii august. Temperatura medie decadică a aerului a constituit $+24,1..+26,9^{\circ}\text{C}$, depășind valorile normei cu $3,1-4,5^{\circ}\text{C}$, ceea ce în ultimii 20 de ani se semnalează în medie o dată la 3 ani.

°C





Fig. 1 Temperatura medie decadică a aerului, SM Chișinău

Cantitatea de precipitații pe parcursul sezonului pe 50% din teritoriu a constituit **145-250 mm (80-125% din normă)**. În restul teritoriului suma acestora nu a depășit **85-140 mm (50-75% din normă)**.



- Potrivit distribuției în profil regional, cantitatea de precipitații a fost repartizată astfel:
- Zona de nord – în fond 150-250 mm (80-125% din normă), izolat – 95-145 mm (40-75% din normă);
 - Zona de centru – în fond 90-135 mm (50-75% din normă), pe alocuri – 200-220 mm (95-115% din normă);
 - Zona de sud – în fond 85-140 mm (50-75% din normă), local – 150-230 mm (85-125% din normă).

Multe de precipitații au căzut în prima decadă a lunii iunie (fig.2). Cantitatea acestora pe 80% din teritoriul țării a constituit 25-70 mm (100-300% din norma decadică). Izolat în raioanele nord și

centrale suma acestora a atins 75-125 mm (320-575% din norma decadică sau 105-160% din norma lunară).

Deficit semnificativ de precipitații pe 50% din teritoriu s-au observat în lunile iulie și august, suma acestora în această perioadă nu a depășit 35-75 mm (30-55% din normă).




Fig. 2 Cantitatea precipitațiilor pe decade, SM Bălțata

În unele zile pe parcursul sezonului izolat pe teritoriu s-au semnalat fenomene meteorologice extreme sub formă de ploi torențiale:

Pe 6 iunie:

- la stația meteorologică Cornești în decurs de 9 ore au căzut 52 mm de precipitații;
- la postul agrometeorologic Strășeni în decurs de 12 ore au căzut 74 mm de precipitații;
- la postul agrometeorologic Telenești în decurs de 12 ore au căzut 69 mm de precipitații;
- la postul agrometeorologic Nisporeni în decurs de 12 ore au căzut 62 mm de precipitații.

Pe 12 iunie:

- la stația meteorologică Bravicea în decurs de 9 ore au căzut 62 mm de precipitații;
- la postul agrometeorologic Telenești în decurs de 10 ore au căzut 85 mm de precipitații;
- la postul hidrologic Trinca (raionul Edineț) în decurs de 12 ore au căzut 60 mm de precipitații;
- la postul hidrologic Brînzeni (raionul Edineț) în decurs de 12 ore au căzut 57 mm de precipitații.

Pe 2 iulie:

- la postul hidrologic Giurgiulești (raionul Cahul) în decurs de 3 ore au căzut 62 mm de precipitații.

Pe 4 iulie:

- pe 4 iulie, la stația meteorologică Comrat în decurs de o oră au căzut 48 mm de precipitații, iar în decurs de 2 ore – 54 mm;
- la postul agrometeorologic Basarabeasca în decurs de o oră au căzut 55 mm de precipitații.

Pe 19 iulie:

- la stația meteorologică Leova în decurs de o oră au căzut 35 mm de precipitații;
- la postul meteorologic automat Cantemir în decurs de 3 ore au căzut 62 mm de precipitații.

Ploile puternice, izolat cu grindină, au provocat deteriorări semnificative obiectivelor economiei naționale și terenurilor agricole.

De asemenea pe parcursul sezonului s-au semnalat ceață, descărcări electrice și intensificări ale vântului până la 15-21 m/s.

Comparativ cu vara din anul 2025, temperatura medie a aerului în acest sezon a fost în fond similară.

Condițiile meteorologice pe parcursul perioadei de vară au fost în fond satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole. Deficitul de precipitații, semnalat în cea mai mare parte a lunii august, a provocat scăderea rezervelor de umiditate productivă în sol, ceea ce a înrăutățit puțin starea culturilor prășitoare către sfârșitul perioadei.

Condițiile meteorologice pe parcursul lunii iunie au fost în fond satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, culturilor de primăvară și a plantațiilor multianuale. Ploile, căzute în prima jumătate a lunii iunie, au completat semnificativ rezervele de umiditate productivă din sol, însă izolat au provocat vătămarea culturilor agricole.

Culturile de toamnă. La culturile de toamnă, în prima jumătate a lunii s-a semnalat înflorirea și maturitatea în lapte, în a doua jumătate – maturitatea în ceară și deplină.

Culturile de primăvară. La porumb pe parcursul lunii a continuat formarea frunzelor, spre sfârșitul perioadei s-au format în fond frunzele a noua și a unsprezecea, pe semănăturile mai timpurii s-a semnalat formarea frunzelor a treisprezecea și a cincisprezecea. Înălțimea plantelor la sfârșitul lunii a constituit în fond 100-165 cm, izolat – 75-95 cm.

La situația din 28 iunie, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu adâncimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb au constituit: în nordul țării – 45-80 mm (90-135% din normă); în centru – în fond 50-70 mm (90-130% din normă), izolat – 25-35 mm (50-65% din normă); în sud – 20-45 mm (45-60% din normă).

Rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu *porumb* au constituit: în nordul țării – 100-160 mm (90-130% din normă); în centru – 75-130 mm (70-110% din normă); în sud – în fond 75-105 mm (75-80% din normă), izolat – 45-70 mm (40-55% din normă).

La floarea-soarelui, pe parcursul lunii iunie s-au semnalat formarea frunzelor ulterioare și formarea inflorescențelor. Înălțimea plantelor la sfârșitul lunii a constituit în fond 85-175 cm, pe semănăturile mai târzii – 55-75 cm.

La situația din 28 iunie, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu adâncimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit: în jumătatea de nord a țării – 40-80 mm (80-140% din normă); în jumătatea de sud – 15-35 mm (40-70% din normă).

Rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit: în jumătatea de nord a țării – 80-140 mm (105-125% din normă); în jumătatea de sud – în fond 60-95 mm (75-110% din normă), izolat – 45-50 mm (50-55% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii iunie s-au atestat formarea frunzelor ulterioare și creșterea rădăcinii principale, spre sfârșitul lunii a început acoperirea integrală a spațiilor dintre rânduri.

Culturile pomicole și vița-de-vie. La culturile pomicole pe parcursul lunii a continuat creșterea rodului, la cireș, vișin, soiurile timpurii de cais și piersic – coacerea și recoltarea. La vița-de-vie, la începutul lunii a continuat înflorirea, în a doua jumătate a lunii iunie s-a semnalat creșterea boabelor.

La situația din 28 iunie, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit: în nordul și centrul țării – 65-115 mm (70-100% din normă); în sud – 60-105 mm (70-95% din normă).

Condițiile meteorologice pe parcursul lunii iulie, au fost în fond satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole, precum și pentru recoltarea culturilor cerealiere de toamnă.

Culturile de toamnă. La începutul lunii, la culturile de toamnă s-a semnalat maturitatea în ceară și deplină. În cursul lunii, gospodăriile agricole au efectuat recoltarea culturilor cerealiere de toamnă.

Culturile de primăvară. La porumb, la începutul lunii iulie a continuat în fond formarea frunzelor, în a doua jumătate a lunii s-au semnalat apariția paniculului, înflorirea paniculului și a știuletelui. Spre sfârșitul lunii iulie, izolat în raioanele de sud s-a semnalat maturitatea în lapte. Înălțimea plantelor la sfârșitul lunii a constituit în fond 190-255 cm, izolat – 145-175 cm. La o plantă de porumb s-au format în medie 1-2 știuleți.

La situația din 28 iulie, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au constituit: în nordul țării – în fond 20-65 mm (25-60% din normă), izolat – 90-105 mm (85-100% din normă); în centru – în fond 45-60 mm (50-70% din normă), izolat – 80-115 mm (80-120% din normă); în sud – în fond 35-60 mm (35-65% din normă), izolat – 70-115 mm (85-125% din normă).

La floarea-soarelui, pe parcursul lunii s-a semnalat înflorirea și creșterea capitoului, spre sfârșitul lunii izolat a început coacerea semințelor. Înălțimea plantelor la sfârșitul lunii a constituit în fond 160-200 cm, izolat – 115-150 cm. Diametrul capitoului a constituit în fond 10-15 cm, izolat – 16-22 cm.

La situația din 28 iulie, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit: în jumătatea de nord a țării – în fond 15-70 mm (20-65% din normă), izolat – 75-100 mm (75-105% din normă); în jumătatea de sud – în fond 25-50 mm (40-60% din normă), izolat – 70-85 mm (120-125% din normă);

La sfecla de zahăr, pe parcursul lunii iulie a continuat creșterea rădăcinii principale și s-a semnalat acoperirea integrală a spațiului dintre rânduri.

Culturile pomicole și vița-de-vie. La culturile pomicole, pe parcursul lunii a continuat creșterea rodului, la cais, piersic, soiurile timpurii de prun și măr – coacerea și recoltarea. La vița-de-vie pe parcursul lunii a continuat creșterea boabelor, spre sfârșitul perioadei la soiurile timpurii a început coacerea.

La situația din 28 iulie, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit: în nordul și centrul țării – 30-70 mm (40-75% din normă); în sud – în fond 50-70 mm (60-70% din normă), izolat – 75-100 mm (75-140% din normă).

Condițiile meteorologice **pe parcursul lunii august** pe o mare parte a teritoriului țării au fost satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole. Însă, din cauza deficitului semnificativ de precipitații și ca urmare a rezervelor scăzute de umiditate productivă în sol, izolat pe teritoriul țării s-au semnalat condiții nefavorabile pentru formarea roadei culturilor agricole. Ploile căzute la sfârșitul lunii, izolat au îmbunătățit condițiile pentru pregătirea terenurilor către semănatul culturilor de toamnă.

Culturile de primăvară. La porumb, la începutul lunii august s-a semnalat în fond maturitatea în lapte, izolat a continuat înflorirea știuletelui. Spre sfârșitul lunii s-au semnalat fazele: maturitatea în ceară și deplină.

La situația din 18 august, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au constituit: în nordul țării – 35-50 mm (40-65% din normă); în centru – 25-60 mm (30-70% din normă); în sud – 10-50 mm (10-65% din normă).

La floarea-soarelui, pe parcursul lunii august a continuat coacerea semințelor, spre sfârșitul lunii în fond s-a semnalat maturitatea deplină. Unele gospodării agricole au început recoltarea florii-soarelui.

La situația din 18 august, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit: în jumătatea de nord a țării – 15-65 mm (30-65% din normă); în jumătatea de sud – 7-10 mm (10-20% din normă).

La sfecla de zahăr, pe parcursul lunii august a continuat creșterea rădăcinii principale, s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rânduri și îngălbenirea frunzelor inferioare.

Culturile pomicole și vița-de-vie. La culturile pomicole, pe parcursul lunii a continuat creșterea rodului. La piersic, prun, păr și măr a continuat coacerea și recoltarea. La soiurile tehnice de struguri a continuat creșterea boabelor, spre sfârșitul lunii a început coacerea. La soiurile de struguri de masă s-a semnalat coacerea boabelor, s-a efectuat recoltarea strugurilor.

La situația din 28 august, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit: în jumătatea de nord a țării – 30-50 mm (35-55% din normă); în jumătatea de sud – 30-60 mm (45-75% din normă).